

ブリモニジン

酒石酸塩点眼液0.1%[NIT]を
使用されている方へ



1

点眼前には手をきれいに洗ってください。



2

点眼時に容器の先が、目やまぶた、まつ毛にふれないように注意して1滴だけ点眼してください。



3

点眼後は目を閉じて、1～5分間目頭を軽く押さえてください。

※目頭を押さえることで薬液が鼻などに流れ込むのをおさえることができます。



点眼後に何か異常を感じた場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

ブリモニジン

酒石酸塩点眼液0.1%[NIT]

を使用されている方へ

点眼時の注意

- この目薬は、1回1滴、1日2回点眼します。1回1滴を超えて使用しないでください。
※点眼時間については、医師にご相談ください。
- 他の目薬も使用している場合には、5分以上間隔をあけてから点眼してください。
- 容器の先が目に触れないように点眼してください。

保存上の注意

- 付属の投薬袋に入れて室温(1~30℃)で保存してください。
- 開封後4週間経過した場合は、残りの目薬を使わないでください。

その他

- 点眼時、手指の温度が室温や液温よりも高い場合、キャップを開けた際に中栓内部にたまっていた液が飛び出し、漏れてくることがありますのでご注意ください。
- 使用中、眠気、めまい、目のかすみなどが起こることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作には十分にご注意ください。
- 点眼により、しみる・痛いなどの自覚症状が続く場合には、すぐに医師の診察を受けるようにしてください。

発売元
製造
販売元

日東メディック株式会社
東亜薬品株式会社

見やすいユニバーサルカラーとユニバーサルフォントを採用しています。

CS0201A21B
2021年9月作成 (K)

UD
FONT



MUD
P10424