

ブリンゾラミド

けん だく せい
懸濁性点眼液1%「ニットー」
をお使いになる方へ



この目薬は、緑内障・高眼圧症治療薬であり、
眼圧を下げる効果があります。

1

点眼前には手をきれいに
洗ってください。



2

けん だく せい
懸濁性のお薬ですので、
キャップを閉じたまま容器を
よく振ってください。



3

点眼時に容器の先が、目やまぶた、
まつ毛にふれないように注意して
1滴だけ点眼してください。



4

点眼後は目を閉じて、1～5分間
目頭を軽く押さえてください。

※目頭を押さえることで
薬液が鼻などに流れ込むのを
おさえることができます。



点眼後に何か異常を感じたときは、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

ブリンゾラミド^{けんたくせい}懸濁性点眼液1%「ニットー」を お使いになる方へ

点眼時の注意

- この目薬は、1回1滴、1日2回点眼します。1回1滴を超えて使用しないでください。
※点眼時間については主治医にご相談ください。
- ソフトコンタクトレンズをつけている場合は、レンズを外してから点眼し、15分以上経ってからレンズをつけてください。
- 他の目薬も使用している場合には、10分以上間隔をあけてから点眼してください。

保存上の注意

- 付属の投薬袋に入れて室温（1～30℃）で保存してください。
- 開封後4週間経過した場合は、残りの目薬を使わないでください。

その他の注意

- 点眼により、しみる・かゆい・痛いなどの自覚症状が続く場合には、すぐに医師の診断を受けるようにしてください。
- 点眼後、一時的に目がかすむことがあります。このような場合には、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転はしないようにしてください。
- その他、点眼後に何か異常を感じた場合は、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

