

ブロムフェナクNa 点眼液 0.1%「ニットー」 を使用される方へ



1

点眼前には手をきれいに洗ってください。



2

点眼時に容器の先が、目やまぶた、まつ毛に触れないように注意してください。



3

目からあふれた薬液は、すみやかに濡れた清潔なティッシュやガーゼでふき取ってください。



点眼後に何か異常を感じた場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

ブロムフェナクNa点眼液 0.1%「ニットー」 を使用される方へ

副作用について

以下のような症状があらわれることがあります。症状があらわれた場合は、使用を中止し、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- 激しい痛み
- 涙が出る

点眼時の注意

- 医師に指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- 容器の先が目には触れないように点眼してください。
- 点眼後は目を閉じて、1～5分間目頭を軽く押さえてください。
- 他の目薬も使用している場合は、5分以上間隔をあけてから点眼してください。

保存上の注意

- 室温(1～30℃)で保存してください。
- 医師が指示した使用期間を守り、残りの目薬を使わないでください。

その他の注意

- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 点眼時、手指の温度が室温や液温よりも高い場合、キャップを開けた際に中栓内部にたまっていた液が飛び出し、漏れてくる場合がありますのでご注意ください。

発売元

日東メディック株式会社

製造
販売元

東亜薬品株式会社

BM0201A23A
2024年4月作成(A)