

ジクアホソルNa

点眼液3%「ニットー」


を使用される方へ

この目薬は、青色のカラーノズルを使用しています。



1

点眼前には手をきれいに洗ってください。



2

点眼時に容器の先が、目やまぶた、まつ毛に触れないように注意してください。



3

目からあふれた薬液は、すみやかに濡れた清潔なティッシュやガーゼでふき取ってください。



点眼後に何か異常を感じた場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

ジクアホソルNa 点眼液3%「ニットー」 を使用される方へ

副作用について

以下のような症状があらわれることがあります。症状が続く場合は医師または薬剤師にご相談ください。

- 目がしみる ○目ヤニが出る ○充血 ○目の痛み
- 目のかゆみ ○目の異物感 ○目の不快感 など

点眼時の注意

- 医師に指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- 通常、1回1滴を1日6回点眼します。
- 点眼後は目を閉じて、1～5分間目頭を軽く押さえてください。
- 他の目薬も使用している場合は、5分以上間隔をあけて点眼してください。
- 容器の先が目に触れないように点眼してください。
- ソフトコンタクトレンズを装着している場合は、点眼前にレンズを外し、点眼後、少なくとも5～10分間の間隔をあけて再度装着してください。

保存上の注意

- 付属の投薬袋に入れて、室温(1～30℃)で保存してください。
- 医師が指示した使用期間を守り、残りの目薬を使わないでください。

その他の注意

- 点眼時、手指の温度が室温や液温よりも高い場合、キャップを開けた際に中栓内部にたまっていた液が飛び出し、漏れてくる場合がありますのでご注意ください。
- 容器先端部の周囲やキャップ内側などに液が付着して乾燥した場合、薬液の成分の性質上、白い結晶物が見られることがありますが、容器内の点眼液の品質には影響ありません。使用前にこのような結晶物が見つかった場合、清潔なティッシュやガーゼなどで軽くふき取ってからご使用ください。

発売元

日東メディック株式会社

製造
販売元

東亜薬品株式会社

DA0201A23A
2023年10月作成(A)