

ドルモロール[®] 配合点眼液「ニットー」 を使用される方へ



1

点眼前には手をきれいに洗ってください。



2

点眼時に容器の先が、目やまぶた、まつ毛にふれないように注意して1滴だけ点眼してください。

※点眼したときにしみることがあります。



3

点眼後は目を閉じて、1～5分間目頭を軽く押さえてください。

※目頭を押さえることで薬液が鼻などに流れ込むのをおさえることができます。



点眼後に何か異常を感じた場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

ドルモロール®配合点眼液「ニットー」 を使用される方へ

副作用について

- 点眼により、以下のような症状が出る可能性があります。
このような場合、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

・充血、目の痛み、
目の異物感



・息切れ、
息苦しさ



・脈がとぶ、
脈が減る



・目のまわりのアレルギー
(腫れや赤み、かゆみなど)



点眼時の注意

- この目薬は、1回1滴、1日2回点眼します。
※点眼する時間については、医師にご相談ください。
- 点眼後は目を閉じて、1～5分間目頭を軽く押さえてください。
- 他の目薬も使用している場合には、5分以上間隔をあけてから点眼してください。
- 容器の先が目に触れないように点眼してください。
- ソフトコンタクトレンズを装着している場合は、点眼前にレンズを外し、点眼後、少なくとも5～10分間の間隔をあけて再度装着してください。

保存上の注意

- 付属の遮光袋に入れて室温(1～30℃)で保存してください。
- 開封後4週間経過した場合は、残りの目薬を使わないでください。

発売元
製造
販売元

日東メディック株式会社
東亜薬品株式会社

見やすいユニバーサルカラーとユニバーサルフォントを採用しています。

®登録商標
BB0201A23A
2023年9月作成(K)

UD
FONT

MUD
P10358