

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

「使用上の注意」改訂のお知らせ

《2023年3月》

製造販売元

日東メディック株式会社

富山県富山市八尾町保内1-14-1

アドレナリン α_2 受容体作動薬

緑内障・高眼圧症治療剤

ブリモニジン酒石酸塩点眼液

ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニットー」

処方箋医薬品[※]

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

この度、標記製品につきまして「使用上の注意」を改訂いたしましたのでご案内申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容

改訂後	改訂前（下線部は削除箇所）
14. 適用上の注意 14.1 薬剤交付時の注意 患者に対し以下の点に注意するよう指導すること。 <ul style="list-style-type: none">・薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意すること。・患眼を開眼して結膜囊内に点眼し、1～5分間閉眼して涙嚢部を圧迫させた後、開眼すること。・他の点眼剤を併用する場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼すること。	14. 適用上の注意 14.1 薬剤交付時の注意 患者に対し以下の点に注意するよう指導すること。 <ul style="list-style-type: none">・薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意すること。・<u>点眼に際しては、原則として仰臥位をとり、患眼を開眼して結膜囊内に点眼し、1～5分間閉眼して涙嚢部を圧迫させた後、開眼すること。</u>・他の点眼剤を併用する場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼すること。

(改訂箇所のみ抜粋)

2. 改訂理由

先発医薬品（アイファガン点眼液0.1%）において、一般的に周知されている点眼方法として仰臥位をとることは規定されていないことから、14.1項の記述から「点眼に際しては、原則として仰臥位をとり、」が削除されました。先発医薬品と記載を統一するため、同様に改訂いたしました。（自主改訂）

改訂後の電子化された添付文書は、以下のホームページより閲覧いただけます。

- ・(独)医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)
- ・弊社ホームページの医療関係者向けサイトの製品情報一覧(<https://info.nittomedic.co.jp/list.php>)

また、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ[®]」を利用し、個装箱等のGS1バーコードを読み取ることで、(独)医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されている添付文書を閲覧いただけます。

<問い合わせ先>

日東メディック株式会社 おくすり相談窓口

〒104-0031 東京都中央区京橋 1-10-7 Tel 03-3523-0345/Fax 03-6264-4086