

フルオロメトロン 点眼液0.1%「NIT」

フルオロメトロン 点眼液0.02%「NIT」

を使用される方へ

ご使用の前に容器をよく振って、
白い沈殿物が見えなくなってから
点眼してください。



- 1 点眼前には手をきれいに洗ってください。



- 2 点眼時に容器の先が、目やまぶた、まつ毛に触れないように注意してください。



- 3 目からあふれた薬液は、すみやかに濡れた清潔なティッシュやガーゼでふき取ってください。



点眼後に何か異常を感じた場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

フルオロメトロン 点眼液0.1%「NIT」 フルオロメトロン 点眼液0.02%「NIT」 を使用される方へ

副作用について

長期間使用している際に、以下のような症状があらわれた場合は、使用を中止し、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- 目が痛い ●頭が痛い ●見えにくい

また、以下のような症状が続く場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

- 目が痛い ●赤くなる

点眼時の注意

- 医師に指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- ご使用前に容器をよく振ってから点眼してください。
- 液が目のまわりについた場合には、すぐにふき取ってください。
- 点眼後は目を閉じて、1～5分間目頭を軽く押さえてください。
- 他の目薬も使用している場合は、5分以上間隔をあけて点眼してください。

保存上の注意

- 保管の仕方によって、振り混ぜても粒子が分散しにくくなる場合があるため、上向きに保管してください。
- 室温(1～30℃)で保存してください。
- 医師が指示した使用期間を守り、残りの目薬を使わないでください。

その他の注意

- 点眼時、手指の温度が室温や液温よりも高い場合、キャップを開けた際に中栓内部にたまっていた液が飛び出し、漏れてくることがありますのでご注意ください。