

フルオロメロン点眼液0.1%「ニットー」 フルオロメロン点眼液0.02%「ニットー」 を使用される方へ

ご使用の前に容器をよく振って、
白い沈殿物が見えなくなってから
点眼してください。

※おくすりのふりませ方は裏面をご覧ください。



1 点眼前には手をきれいに
洗ってください。



2 点眼時に容器の先が、目やまぶた、
まつ毛に触れないように
注意してください。



3 目からあふれた薬液は、すみやかに
濡れた清潔なティッシュやガーゼで
ふき取ってください。




点眼後に何か異常を感じた場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

フルオロメロン点眼液0.1%「ニットー」

フルオロメロン点眼液0.02%「ニットー」を使用される方へ


おくすりのふりませ方 白い沈殿物が残らなくなるまで繰り返してください。

- ① 本剤の容器を複数回振って泡立たせてください。



- ② その後、次のようにふりませることをおすすめします。

白い沈殿物が分散するまで、繰り返し上下逆さにしてください。



または

容器を逆さに持ち、白い沈殿物が分散するまで指先で回転させてください。



点眼時の注意

- 医師に指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- ご使用前に容器をよく振ってから点眼してください。
- 液が目のまわりについた場合には、すぐにふき取ってください。
- 他の目薬も使用している場合は、5分以上間隔をあけて点眼してください。

保存上の注意

- 保管の仕方によって、振り混ぜても粒子が分散しにくくなる場合があるため、上向きに保管してください。
- 付属の投薬袋に入れて、室温(1~30℃)で保存してください。
- 医師が指示した使用期間を守り、残りの目薬を使わないでください。

その他の注意

- 点眼時、手指の温度が室温や液温よりも高い場合、キャップを開けた際の中栓内部にたまっていた液が飛び出し、漏れてくる場合がありますのでご注意ください。
- 目が痛い、赤くなるなどの自覚症状が続く場合には、医師の診断を受けるようにしてください。
- 長期間使用している際に、目が痛い、頭が痛い、見えにくいなどの自覚症状がある場合には、すぐに医師の診察を受けるようにしてください。