


# レボカバステン 点眼液 0.025%「ニットー」 を使用される方へ



ご使用の前に  
容器をよく振ってから点眼してください。

- 1 点眼前には手をきれいに洗ってください。



- 2 点眼時に容器の先が、目やまぶた、まつ毛に触れないように注意してください。



- 3 目からあふれた薬液は、すみやかに濡れた清潔なティッシュやガーゼでふき取ってください。



点眼後に何か異常を感じた場合は、  
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

# レボカバスチン点眼液 0.025%「ニットー」 を使用される方へ

## 副作用について

以下のような症状があらわれた場合は、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- 息苦しい
- 顔がむくむ

また、以下のような症状が続く場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

- しみる
- 頭の痛み
- まぶたのただれ

## 点眼時の注意

- 医師に指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- コンタクトレンズの上から点眼しないでください。
- ご使用前に容器をよく振ってから点眼してください。
- 容器の先が目に触れないように点眼してください。
- 液が目のまわりについた場合には、すみやかにふき取ってください。
- 点眼後は目を閉じて、1～5分間目頭を軽く押さえてください。
- 他の目薬も使用している場合は、5分以上間隔をあけて点眼してください。

## 保存上の注意

- 保管の仕方によっては、振り混ぜても粒子が分散しにくくなる場合があるため、上向きに保管してください。
- 付属の投薬袋に入れて、室温(1～30℃)で保存してください。
- 医師が指示した使用期間を守り、残りの目薬を使わないでください。

## その他の注意

- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 点眼時、手指の温度が室温や液温よりも高い場合、キャップを開けた際に中栓内部にたまっていた液が飛び出し、漏れてくる場合がありますのでご注意ください。

発売元

**日東メディック株式会社**

製造  
販売元

**東亜薬品株式会社**