

# レボフロキサシン点眼液 0.5%「ニットー」 レボフロキサシン点眼液 1.5%「ニットー」 を使用される方へ



1

点眼前には手を  
きれいに洗ってください。



2

点眼時に容器の先が、  
目やまぶた、まつ毛に  
触れないように  
注意してください。



3

目からあふれた薬液は、  
すみやかに濡れた清潔な  
ティッシュやガーゼで  
ふき取ってください。



点眼後に何か異常を感じた場合は、  
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

# レボフロキサシン点眼液 0.5%「ニットー」 レボフロキサシン点眼液 1.5%「ニットー」 を使用される方へ

## 副作用について

以下のような症状があらわれた場合は、使用を中止し、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- 息苦しい
- 全身の皮膚が赤くなる
- まぶたの腫れ

また、以下のような症状が続く場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

- しみる
- かゆい

## 点眼時の注意

- 医師に指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- 点眼後は目を閉じて、1～5分間目頭を軽く押さえてください。
- 容器の先が目には触れないように点眼してください。
- 他の目薬も使用している場合は、5分以上間隔をあけて点眼してください。

## 保存上の注意

- 付属の遮光袋に入れて、室温(1～30℃)で保存してください。
- 医師が指示した使用期間を守り、残りの目薬を使わないでください。

## その他の注意

点眼時、手指の温度が室温や液温よりも高い場合、キャップを開けた際に中栓内部にたまっていた液が飛び出し、漏れてくる場合がありますのでご注意ください。

発売元

**日東メディック株式会社**

製造  
販売元

**東亜薬品株式会社**