


モキシフロキサシン 点眼液0.5%「ニットー」 を使用される方へ



1 点眼前には手を
きれいに洗ってください。



2 点眼時に容器の先が、
目やまぶた、まつ毛に
触れないように
注意してください。



3 目からあふれた薬液は、
すみやかに濡れた清潔な
ティッシュやガーゼで
ふき取ってください。



点眼後に何か異常を感じた場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

モキシフロキサシン 点眼液0.5%「ニットー」 を使用される方へ

副作用について

以下のような症状があらわれた場合は、使用を中止し、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- 息苦しい
 - 全身の皮膚が赤くなる
 - 発疹
 - 血圧の低下
- また、以下のような症状が続く場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- しみる
 - 苦い

点眼時の注意

- 医師に指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- 点眼後は目を閉じて、1～5分間目頭を軽く押さえてください。
- 容器の先が目には触れないように点眼してください。
- 他の目薬も使用している場合は、5分以上間隔をあけて点眼してください。

保存上の注意

- 付属の投薬袋に入れて、室温(1～30℃)で保存してください。
- 医師が指示した使用期間を守り、残りの目薬を使わないでください。

その他の注意

点眼時、手指の温度が室温や液温よりも高い場合、キャップを開けた際に中栓内部にたまっていた液が飛び出し、漏れてくる場合がありますのでご注意ください。

発売元

日東メディック株式会社

製造
販売元

東亜薬品株式会社

CO0201A23A
2023年12月作成(D)