

オロパタジン 点眼液0.1%「ニットー」 をご使用される方へ



- 1** 点眼前には手をきれいに洗ってください。



- 2** 点眼時に容器の先が、目やまぶた、まつ毛に触れないように注意してください。



- 3** 目からあふれた薬液は、すみやかに濡れた清潔なティッシュやガーゼでふき取ってください。



点眼後に何か異常を感じた場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

オロパタジン

点眼液0.1%「ニットー」

をご使用される方へ

点眼時の注意

- 医師に指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- コンタクトレンズの上から点眼せずに、点眼前にレンズを外し、点眼後10分以上経過した後に再度装用してください。
- 他の目薬も使用している場合は、5分以上間隔をあけて点眼してください。
- 容器の先が目には触れないように点眼してください。
- 薬液がまぶたの皮膚などについた場合は、すぐにふき取ってください。

保存上の注意

- 付属の遮光袋に入れて、室温(1~30℃)で保存してください。
- 医師が指示した使用期間を守り、残りの目薬を使わないでください。

その他の注意

- 点眼時、手指の温度が室温や液温よりも高い場合、キャップを開けた際に中栓内部にたまっていた液が飛び出し、漏れてくる場合がありますのでご注意ください。
- 点眼後、目の痛み、かゆみなどの自覚症状が続く場合は、医師の診察を受けるようにしてください。

発売元

日東メディック株式会社

製造
販売元

東亜薬品株式会社

CT0201A21A
2021年10月作成(A)