

オゼックス[®]点眼液0.3% を使用される方へ



1

点眼前には手を
きれいに洗ってください。



2

点眼時に容器の先が、
目やまぶた、まつ毛に
触れないように
注意してください。



3

目からあふれた薬液は、
すみやかに清潔な
ティッシュやガーゼなどで
ふき取ってください。



点眼後に何か異常を感じた場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

オゼックス[®]点眼液0.3% を使用される方へ

副作用について

以下のような症状があらわれることがあります。症状が続く場合は医師または薬剤師にご相談ください。

- 目がしみる
- 点状角膜炎などの角膜障害
- など

以下のような症状があらわれることがあります。症状があらわれた場合は、使用を中止し、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- 皮膚が赤くなる
- 息苦しい
- まぶたの腫れ

点眼時の注意

- 医師に指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- 点眼後は目を閉じて、1～5分間目頭を軽く押さえてください。
- 容器の先が目には触れないように点眼してください。
- ソフトコンタクトレンズを装用したまま点眼すると、ソフトコンタクトレンズが白濁することがあります。
- 他の目薬も使用している場合は、5分以上間隔をあけて点眼してください。

保存上の注意

- 室温(1～30℃)で保存してください。
- 開封後4週間経過した場合は、残りの目薬を使わないでください。

その他の注意

点眼時、手指の温度が室温や液温よりも高い場合、キャップを開けた際に中栓内部にたまっていた液が飛び出し、漏れてくる場合がありますのでご注意ください。