

# タフチモ<sup>®</sup> 配合点眼液「NIT」 を使用される方へ



薬液は容器の半分の量が入っていますが、  
治療に必要な量が入っています。

## 点眼後の注意点

点眼後、目からあふれた薬液が皮膚についたまま放置しつづけると、少しずつ目のまわりが黒ずんだり、まつ毛が長く、太くなることがあります。

- 目からあふれた薬液は、すみやかに濡れた清潔なティッシュやタオルでふき取ってください。



または



- 目を閉じて、あふれた薬液を洗い流してください。

## 点眼のタイミング

※点眼時間については医師にご相談ください。

日常生活では次のタイミングで点眼することをおすすめします。

洗顔  
前に



入浴  
前に



点眼後に何か異常を感じた場合は、  
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

# タフチモ<sup>®</sup> 配合点眼液「NIT」を使用される方へ

## 副作用について

以下のような症状があらわれることがあります。症状が続く場合は医師または薬剤師にご相談ください。

- 目の異物感、目の痛み、充血
- 目のまわりのアレルギー(腫れや赤み、かゆみなど)
- 目のまわりが黒ずむ、まつげが長く太くなる、瞳の色が濃くなる
- 息切れ、息苦しい、息をするとゼーゼーヒューヒュー鳴る
- 脈が減る、脈が途切れる

## 点眼時の注意

●この目薬は、1回1滴、1日1回点眼します。1日1回を超えて使用しないでください。

※点眼する時間については、医師にご相談ください。

- 点眼後は目を閉じて、1~5分間目頭を軽く押さえてください。
- 他の目薬も使用している場合は、5分以上間隔をあけてから点眼してください。
- 容器の先が目に触れないように点眼してください。

## 保存上の注意

- 専用の遮光袋に入れて、室温(1~30℃)で保存してください。
- 開封後4週間経過した場合は、残りの目薬を使わないでください。

## その他の注意

- 点眼時、手指の温度が室温や液温よりも高い場合、キャップを開けた際に中栓内部にたまっていた液が飛び出し、漏れてくる場合がありますのでご注意ください。
- 点眼後、一時的に目がかすむことがあります。このような場合には、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転はしないようにしてください。