

チモロールXE点眼液0.25%「ニットー」 チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」 をお使いになる方へ

この目薬は、緑内障・高眼圧症治療薬であり、眼圧を下げる効果があります。容器に対して内容量が少なく見えますが、2.5mL(規定の量)が入っています。

他の目薬と併用する際は、10分間の間隔をあげ、本剤を最後に点眼してください。



1 点眼前には手をきれいに洗ってください。



2 ご使用前にキャップをしたまま一度軽く振ってください。点眼時に容器の先が目やまぶた、まつ毛に触れないように注意してください。(点眼時、多少ベタツキや目のかすみを感じる場合があります。)



3 点眼後は目を閉じて、しばらくの間目頭を軽く押さえてください。薬液が鼻などに流れ込むのを防ぐため、目頭のあたりを指で押さえるようにしてください。



点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

チモロールXE点眼液0.25%「ニットー」 チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」

をお使いになる方へ

点眼時の注意

- 主治医の指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- この目薬は、1回1滴、1日1回点眼します。1日1回を超えて使用しないでください。
- 他の目薬も使用している場合には、少なくとも10分以上間隔をあけてから点眼してください。
- ご使用になる際は、キャップをしたまま一度軽く振ってからご使用ください。(何度も振る必要はありません。)
- 点眼後、目がかすんだりべたつくことがあります。が、薬の性質なので異常ではありません。

保存上の注意

- 付属の投薬袋に入れて凍結はさけて保存してください。
- 主治医が指示した使用期間を守り、残液は使用しないでください。

その他の注意

- 点眼により、しみる・かゆい・痛いなどの自覚症状が続く場合には、すぐに医師の診察を受けるようにしてください。
- 点眼後、一時的に目がかすむことがあります。このような場合には、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転はしないようにしてください。
- その他、点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- 点眼瓶や目の周りに白い粉が付着することがあります。点眼液に含まれる粘稠剤等の乾燥によるものです。

発売元

日東メディック株式会社

製造
販売元

東亜薬品株式会社