

「使用上の注意」改訂のお知らせ

《2021年7月》

発売元
日東メディック株式会社
富山県富山市八尾町保内1-14-1
製造販売元
東亜薬品株式会社
富山県富山市水橋開発277番10

処方箋医薬品
(注意－医師等の処方箋
により使用すること)

プロスタグランジン F_{2α} 誘導体/β 遮断薬配合
緑内障・高眼圧症治療剤

トラチモ® 配合点眼液「ニットー」
トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩配合点眼液

この度、標記製品につきまして【使用上の注意】を改訂いたしましたのでご案内申し上げます。
改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまで若干の日数が必要ですので、今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容

改訂後（下線部は改訂箇所）			改訂前		
3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること） （省略）			3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること） （省略）		
薬剤名等	臨床症状・ 措置方法	機序・ 危険因子	薬剤名等	臨床症状・ 措置方法	機序・ 危険因子
（省略）			（省略）		
CYP2D6阻害作用を有する薬剤： キノジン 選択的セロトニン 再取り込み阻害 剤	β-遮断作用（例え ば心拍数減少、徐 脈）の増強が報告さ れている。	これらの薬剤 はチモロール の代謝酵素 であるP450 (CYP2D6) を阻害し、チ モロールの血 中濃度が上 昇する可能性 がある。	CYP2D6阻害作 用を有する薬剤： キノジン 選択的セロトニン 再取り込み阻害剤	β-遮断作用（例え ば心拍数減少、徐 脈）の増強が報告さ れている。	これらの薬剤 はチモロール の代謝酵素 であるP450 (CYP2D6) を阻害し、チ モロールの血 中濃度が上 昇する可能性 がある。
オミデネパグ イ ソプロピル	チモロールマレイン 酸塩との併用例で 結膜充血等の眼炎 症性副作用の発現 頻度の上昇が認め られた。	機序不明			

(改訂箇所のみ抜粋)

2. 改訂理由

先発企業からの情報に基づき、「相互作用」を改訂いたしました（自主改訂）。

今回の【使用上の注意】改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報(DSU：Drug Safety Update) No. 301 に掲載される予定です。

<問い合わせ先>

日東メディック株式会社 おくすり相談窓口

〒104-0033 東京都中央区新川 1-17-24 Tel 03-3523-0345/Fax 03-3523-0346

医薬品添付文書改訂情報は（独）医薬品医療機器総合機構のホームページ(<http://www.pmda.go.jp/>)に最新添付文書並びに医薬品安全対策情報(DSU)が掲載されています。あわせてご利用ください。