

トスフロ[®]点眼液0.3% を使用されている方へ



1 点眼前には手をきれいに洗ってください。



2 点眼時に容器の先が、目やまぶた、まつ毛に触れないように注意してください。



3 目からあふれた薬液は、すみやかに清潔なティッシュやガーゼなどでふき取ってください。



点眼後に何か異常を感じた場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

トスフロ[®]点眼液0.3% を使用されている方へ

点眼時の注意

- 医師に指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- ソフトコンタクトレンズを装用したまま点眼すると、ソフトコンタクトレンズが白濁することがあります。
- 他の目薬も使用している場合は、5分以上間隔をあけて点眼してください。

保存上の注意

- 付属の投薬袋に入れて、室温(1～30℃)で保存してください。
- 医師が指示した使用期間を守り、残りの目薬を使わないでください。

その他の注意

- 冷汗、息苦しい、意識障害などの症状があらわれた場合は、使用を中止し、すぐに医師の診療を受けてください。
- 点眼後、しみる、見えにくい、異物感などの自覚症状が続く場合は、医師の診療を受けるようにしてください。

製造
販売元

日東メディック株式会社

®登録商標
AX0201A20A
2021年5月作成(KN)