

トラチモ[®] 配合点眼液「ニットー」 を使用される方へ

薬液は容器の半分の量が入っていますが、
治療に必要な量が入っています。

この目薬は、オレンジ色のカラーノズルを
使用しています。



点眼後の注意点

点眼後、目からあふれた薬液が皮膚についたまま放置しつづけると、少しずつ目のまわりが黒ずんだり、まつ毛が長く、太くなることがあります。

- 目からあふれた薬液は、すみやかに濡れた清潔なティッシュやタオルでふき取ってください。



または




- 目を閉じて、あふれた薬液を洗い流してください。

点眼のタイミング

※点眼時間については医師にご相談ください。

日常生活では次のタイミングで点眼することをおすすめします。

洗顔
前に



入浴
前に



点眼後に何か異常を感じた場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

トラチモ[®]配合点眼液「ニットー」を 使用される方へ

点眼により、以下の自覚症状が続く場合には、医師または薬剤師にご相談ください。

副作用について

●目が赤くなる・しみる・かゆい・刺激を感じる・かすむ
●目のまわりが黒ずむ ●まつ毛が長くなる・太くなる
●瞳の色が黒くなる ●脈が遅くなる ●頭が痛い など
まれに、以下のような症状があらわれることがあります。その場合はすぐに医師の診察を受けてください。

- 目の異物感、眼痛
- 息切れ、息苦しい、息をするとゼーゼーヒューヒュー鳴る
- 呼吸困難、意識障害、立ちくらみ
- 全身倦怠感、発熱、皮膚に赤い斑点ができ日光で悪化する

点眼時の注意

●この目薬は、1回1滴、1日1回点眼します。1日1回を超えて使用しないでください。

※点眼する時間については、医師にご相談ください。

●他の目薬も使用している場合には、5分以上間隔をあけてから点眼してください。

保存上の注意

●付属の遮光袋に入れて室温(1~30℃)で保存してください。

●開封後4週間経過した場合は、残りの目薬を使わないでください。

その他の注意

●点眼時、手指の温度が室温や液温よりも高い場合、キャップを開けた際に中栓内部にたまっていた液が飛び出し、漏れてくる場合がありますのでご注意ください。

●点眼後、一時的に目がかすむことがあります。このような場合には、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転はしないようにしてください。

●点眼後、目が赤くなることがありますが、そのような症状が続く場合は医師にご相談ください。

※多くの場合、点眼を継続すると症状は軽減しますので、ご自身の判断で点眼を中止しないでください。

発売元
製造
販売元

日東デイック株式会社
東亜薬品株式会社

見やすいユニバーサルカラーとユニバーサルフォントを採用しています。

®登録商標
AZ0201A24A
2024年3月作成 (K)

UD
FONT

 MUD
P10376