

トラボプロスト点眼液 0.004% 「ニットー」

【この薬は？】

販売名	トラボプロスト点眼液 0.004% 「ニットー」 Travoprost Ophthalmic Solution 0.004% 「NITTO」
一般名	トラボプロスト Travoprost
含有量 (1 mL 中)	トラボプロスト 0.04mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、緑内障・高眼圧症治療剤と呼ばれるグループに属する点眼薬です。
- ・この薬は、眼圧を調節する水分の排出を促進して眼圧を下げます。
- ・次の病気の人に処方されます。

緑内障、高眼圧症

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にトラボプロスト点眼液 0.004% 「ニットー」に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・水晶体の無い人、眼内レンズを挿入している人
- ・虹彩（こうさい）炎やぶどう膜炎などの眼内炎のある人
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人
- ・授乳中の人

【この薬の使い方は？】

この薬は点眼薬です。

●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、使用する量および回数は、次のとおりです。

1回1滴、1日1回点眼する。

- ・頻繁に点眼すると眼圧を下げる作用が弱まる可能性がありますので、1日1回を超えて点眼しないでください。

●どのように使用するか？

- ・手を良く洗い、点眼するときの容器の先が直接目に触れないように注意して点眼してください。
- ・点眼するときは、原則として仰向けになってください。点眼後は1～5分間目を閉じて、目頭のあたりを軽くおさえてください。
- ・他の点眼薬を使用する場合には、少なくとも5分以上の間をあけてから点眼してください。
- ・点眼液が目の周りについていると、目の周りが黒ずんだり、多毛になったり、まつげが長く、太くなったりすることがあるため、すぐにぬらしたガーゼやティッシュでよくふき取るか、目を閉じて洗顔して下さい。

●使用し忘れた場合の対応

- ・決して1回に2滴点眼してはいけません。
- ・その日のうちに気づいたら、1回1滴を点眼してください。
- ・翌日に気づいた場合は、前日の分は点眼せず、1日1回1滴を点眼してください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

- ・異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・虹彩色素沈着（黒目（虹彩）の色が濃くなる）があらわれることがあります。点眼を中止しても黒目の色が元に戻らないことがあります。また、片眼のみ点眼している場合には、左右の黒目の色に差がでる場合もあります。この薬を使用すると、目の周りが黒ずんだり、多毛になったり、まつげが長く、太くなることがあります。これらは、点眼を中止するとしだいに元にもどる可能性があります。この薬を使用する場合には、これらの症状について、医師、薬剤師などから十分説明を受けてください。
- ・目がしみる、目のかゆみや痛みなどの症状があらわれることがあります。このような自覚症状が持続する場合にはただちに受診してください。

- ・点眼後、一時的に眼がかすむことがあるため、症状が回復するまで機械の操作や自動車の運転等をしないでください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳を中止してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。
このような症状があらわれた場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
虹彩色素沈着 こうさいしきそちんちやく	黒目（虹彩）の色が濃くなる

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
このような症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
眼	黒目（虹彩）の色が濃くなる

【この薬の形は？】

色	無色～淡黄色澄明
内容量	2.5mL
容器の形状	

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	トラボプロスト
添加物	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 40、ホウ酸、プロピレングリコール、D-ソルビトール、20%塩酸ポリヘキサニド液、pH調節剤

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・開封後4週間経過した場合は、残りの点眼液を使わないでください。
- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

発売会社：日東メディック株式会社 (<http://www.nittomedic.co.jp/>)

おくすり相談窓口

電話：03-3523-0345

F A X：03-3523-0346

受付時間：9時～17時(土日、祝祭日及び弊社休日を除く)

製造販売会社：東亜薬品株式会社 (<http://www.toyakuhin.co.jp/>)